

Regionalanestesi och Antitrombotisk behandling

Dagkirurgimöte Västerås 11-12
april 2012

Gun-Inger Mattsson, Op.klin.

Nordic guidelines

- Innefattar spinal och epidural
- Säger egentligen inget om perifera nervblockader
- SFAI:s riktlinjer bygger på dessa

Ryggbedövning

- Tidsintervall från tillförelse av antikoagulantia till anläggande av ryggbedövning
- Tidsintervall från anläggande av ryggbedövning, katetermanipulation eller borttagande av kateter till administration av antikoagulantia

Tidsintervall

- **Antikoag→Ryggbed**
- Heparin 4 tim
- LMWH 10-12 tim
- Xarelto/Arixtra 18/36 tim
- Waran 1-4 d,
dosberoende, PK<1,5
- ASA 12-72 tim
- NSAID 12-48 tim
- ADPrec.inhib. 5 d
- **Ryggbed→Antikoag**
- Heparin 6 tim
- LMWH 6 tim
- Xarelto, Arixtra 6 tim
- Waran åter efter kateter bort
- ASA åter efter kirurgi
- ?
- ADPrec.inhib åter efter kateter bort

Perifera blockader

- Inga guidelines, få artiklar
- Inga egentliga kontraindikationer
- Undantag lumbal plexusblockad och andra djupa, ej kompressibla områden
- Van anesthesiolog
- Ultraljud
- Antitrombotisk behandling sätts ut av operatören!?

Ultraljud

- Tekniken har ökat möjligheten att lägga blockader även på antikoagulerade pat
- Man ser kärl och nerver, kan undvika att skada strukturerna
- Referens: Ultrasound-guided femoral and sciatic blocks in an anticoagulated patient
Rev Bras Anesthesiol 2012 Jul-Aug 60:422-8
Ferraro LH et al

Tack för uppmärksamheten!

